

土壤 α -葡萄糖苷酶(S-AG)测试盒说明书

产品货号	产品名称	包装规格	测定方法
SMHB4-C24	土壤 α -葡萄糖苷酶 (S-AG)试剂盒	24T	常量法
SMHB4-C48		48T	

一、测定意义：

土壤 α -葡萄糖苷酶深度参与土壤有机质的转化过程，主要是由以纤维素为底物的微生物分泌，水解纤维二糖和其他水溶性的纤维糊精产生形成葡萄糖，供微生物自身生长利用。土壤 α -葡萄糖苷酶的活性能够反映土壤形成的生物气候及生态学条件、土壤生物化学过程的强度及土壤肥力水平。

二、测定原理：

以对硝基苯- α -D 吡喃葡萄糖苷为底物，水解生成对硝基酚，产物显黄色，在 400nm 有特征吸收峰，测定其吸光度值的变化来计算酶活性。

三、试剂盒组成：

试剂名称	试剂装量 (24T)	试剂装量 (48T)	保存条件
甲苯	自备	自备	2-8℃保存
试剂一	30mL×1 瓶	60mL×1 瓶	2-8℃保存
试剂二	粉剂×1 瓶	粉剂×2 瓶	-20℃保存
试剂二应用液配制：每瓶粉剂加入试剂一 3mL，充分溶解。			
试剂三	6mL×1 瓶	12mL×1 瓶	2-8℃保存
试剂四	60mL×1 瓶	100mL×1 瓶	2-8℃保存
标准品 (1mg/mL)	1mL×1 瓶	1mL×1 瓶	2-8℃保存

四、操作步骤：

样本前处理

新鲜土样自然风干或者 37℃烘箱风干，过 30-50 目筛。

操作步骤

1、培养反应（将试剂依次加入离心管中）：

试剂名称	测定管	对照管
------	-----	-----

土样 (g)	0.1	0.1
甲苯 (μL)	50	50
震荡混匀，使土样全部湿润，室温静置 15min		
试剂一 (μL)	500	500
蒸馏水 (μL)	-	100
试剂二应用液 (μL)	100	-
混匀，37℃孵育 3h		
试剂三 (μL)	100	100
混匀，10000 转/min 常温离心 10min，取上清液备用。		

2、显色反应（在离心管中加入以下试剂）：

试剂名称	测定管	对照管	标准管
上清液 (μL)	100	100	-
标准品 (μL)	-	-	100
试剂四 (μL)	900	900	900
混匀，静置 10min，波长 400nm，酶标仪测定各管吸光度值。			
注：每个待测样本需设定一个测定管和一个对照管；			

五、单位定义与计算：

单位定义：每小时每克风干土壤中产生 1μg 对硝基酚为一个酶活力单位。

计算公式：根据标准曲线，将吸光度值带入标曲计算出上清液中浓度 Y (μg/mL)。

$$S-AG(U/g \text{ 土样}) = (Y_{\text{测定管}} - Y_{\text{对照管}}) \times V_{\text{反应}} \div W \div T$$

T：反应时间，3h；V_{反应}：反应液总体积，0.7mL；W：样本质量，0.1g。

六、注意事项：

- 1、比色时，溶液呈现淡黄色，在 2h 内保持稳定。
- 2、不同土壤样本的 α -葡萄糖苷酶差异较大，根据样本活性可以适当增加或者减少称取样本重量，也可增加反应时间。
- 3、甲苯易挥发，操作时候宜在通风橱中进行。

附录 I：标准曲线的制备

1、前处理：

将 1mg/mL 的标准品用双蒸水稀释成 0、3.125、6.25、12.5、25、50、100 μ g/mL 标准液进行标准曲线的制备。


2、操作表：

标准品浓度 (μ g/mL)	0	3.125	6.25	12.5	25	50	100
标准品 (μ L)	100	100	100	100	100	100	100
试剂四 (μ L)	900	900	900	900	900	900	900

混匀，静置 10min，波长 400nm，酶标仪测定各管吸光度值。

3、测定结果：

标准品浓度 (μ g/mL)	吸光度值	绝对吸光度值
0	0.001	0.000
3.125	0.049	0.048
6.25	0.089	0.088
12.5	0.166	0.165
25	0.319	0.318
50	0.603	0.602
100	1.225	1.224



【厂家信息】

生产企业：南京陌凡生物科技有限公司

地址：南京市栖霞区红枫科技园 A6 栋 2 层

【售后微信】



【说明书核准及修改日期】

核准日期：2025 年 4 月 7 日

修改日期：2025 年 4 月 7 日