

土壤 N-乙酰氨基葡萄糖苷酶(S-NAG)测试盒说明书

产品货号	产品名称	包装规格	测定方法
SMHB6-M48	土壤 N-乙酰氨基葡萄糖苷酶(S-NAG)试剂盒	48T	微量法
SMHB6-M96		96T	

一、测定意义：

土壤 N-乙酰葡萄糖苷酶（S-NAG）是土壤微生物分泌的溶酶体中的一种酸性水解酶,与几丁质的转化起到重要作用。

二、测定原理：

以对硝基苯基-N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷为底物，水解生成对硝基酚，产物显黄色，在 400nm 有特征吸收峰，测定其吸光度值的变化来计算酶活性。

三、试剂盒组成：

试剂名称	试剂装量(48T)	试剂装量(96T)	保存条件
甲苯	自备	自备	室温保存
试剂一	30mL×1 瓶	60mL×1 瓶	2-8℃保存
试剂二	粉剂×1 瓶	粉剂×2 瓶	-20℃保存
试剂二应用液配制：每瓶粉剂加入试剂一 3mL，充分溶解。			
试剂三	6mL×1 瓶	12mL×1 瓶	2-8℃保存
试剂四	30mL×1 瓶	50mL×1 瓶	2-8℃保存
标准品 (1mg/mL)	1mL×1 瓶	1mL×1 瓶	2-8℃保存

四、操作步骤：

样本前处理

新鲜土样自然风干或者 37℃烘箱风干，过 30-50 目筛。

操作步骤

1、培养反应（将试剂依次加入离心管中）：

	测定管	对照管
土样（g）	0.05	0.05
甲苯（μL）	25	25
震荡混匀，使土样全部湿润，室温静置 15min		

试剂一（μL）	250	250
蒸馏水（μL）	-	50
试剂二应用液（μL）	50	-
混匀，37℃孵育 3h		
试剂三（μL）	50	50
混匀，10000 转/min 常温离心 10min，取上清液备用。		

2、显色反应（将试剂依次加入 96 孔板中）：

	测定管	对照管	标准管
上清液（μL）	20	20	-
不同浓度的标准品（μL）	-	-	20
试剂四（μL）	180	180	180
混匀，静置 10min，波长 400nm，酶标仪测定各管吸光度值。注：每个待测样本需设定一个测定管和一个对照管；			

五、单位定义与计算：

单位定义：每小时每克风干土壤中产生 1μg 对硝基酚为一个酶活力单位

计算公式：根据标准曲线，将吸光度值带入标曲计算出上清液中浓度 Y（μg/mL）

$$S-NAG(U/g \text{ 土样}) = (Y_{\text{测定}} - Y_{\text{对照}}) \times V_{\text{反应}} \div W \div T$$

T：反应时间，3h；V_{反应}：反应液体积，0.35mL；

W：样本质量，0.05g。

六、注意事项：

1、比色时，溶液呈现淡黄色，在 2h 内保持稳定。

2、不同土壤样本的 N-乙酰氨基葡萄糖苷酶差异较大，根据样本活性可以适当增加或者减少称取样本重量，也可增加反应时间。

3、甲苯易挥发，操作时候宜在通风橱中进行。

附录 I：标准曲线的制备

1、前处理：

将 1mg/mL 的标准品用双蒸水稀释成 0、3.125、6.25、12.5、25、50、100 μ g/mL 标准液进行标准曲线的制备。


2、操作表：

标准品浓度 (μ g/mL)	0	3.125	6.25	12.5	25	50	100
标准品 (μ L)	20	20	20	20	20	20	20
试剂四 (μ L)	180	180	180	180	180	180	180

混匀，静置 10min，波长 400nm，酶标仪测定各管吸光度值。

3、测定结果：

标准品浓度 (μ g/mL)	吸光度值	绝对吸光度值
0	0.0046	0.0000
3.125	0.0263	0.0217
6.25	0.0488	0.0442
12.5	0.0970	0.0924
25	0.1931	0.1885
50	0.3779	0.3733
100	0.7515	0.7469



【厂家信息】

生产企业：南京陌凡生物科技有限公司

地址：南京市栖霞区红枫科技园 A6 栋 2 层

【售后微信】



【说明书核准及修改日期】

核准日期：2025 年 4 月 7 日

修改日期：2025 年 4 月 7 日